

La 'Notte europea della civetta' in Italia

GIUSEPPE ARCIDIACONO, MATTEO BARATTIERI, DUCCIO CENTILI, CLAUDIA DONATI, MARCO MASTRORILLI, ARMANDO NAPPI, SARA SANETTI

Gruppo Italiano Civette, c/o Terranostra, via Umberto I 17E, I-24050 Bariano (BG) (civetteitaliane@libero.it)

Le linee guida dell'Action Plan europeo della civetta *Athene noctua* (Leigh 2001, Van Nieuwenhuysse *et al.* 2001) evidenziano nelle azioni dirette per una corretta gestione di questo strigide la priorità nella strategia di divulgazione che mira a far conoscere, ad un pubblico sempre più vasto, le problematiche eco-etologiche della specie. La notte europea della civetta è un evento a cadenza biennale giunto alla sesta edizione; ideato nel 1995 è divenuto, con il passare delle varie edizioni, un evento di portata internazionale (Genot e Lecomte 2002, Mastrotrilli 2005). Alla precedente edizione (2003) hanno aderito numerose nazioni: Francia, Germania, Olanda, Belgio, Svizzera, con la partecipazione di oltre 50000 persone (Jacquat 2003, Genot com. pers.). Nel corso del 2005, in concomitanza della VI edizione, il Gruppo Italiano Civette (G.I.C.) in sinergia con EBN Italia, ha portato questa manifestazione per la prima volta in Italia. Il punto focale dell'evento, coordinato dal G.I.C., è stato la realizzazione di visite guidate notturne che hanno avuto luogo il 19 marzo 2005 in 28 località di 14 regioni italiane ed in oltre cento località in tutta Europa, oltre a un corollario di incontri, dibattiti, proiezioni, mostre, liberazioni di rapaci recuperati. Le singole manifestazioni svolte in tutta la penisola sono state realizzate grazie al coinvolgimento di sezioni di WWF e LI-PU, Enti Parco e Riserve naturali, enti pubblici ed associazioni locali. Nel complesso, 960 persone hanno preso parte alle manifestazioni, di cui 806 sono intervenute alle escursioni notturne, con una media di 28.8 partecipanti per evento (massimo di adesioni nel parco di Monza (MI), con 186 partecipanti). Nel corso delle escursioni notturne è stata impiegata la tecnica del playback (Fuller e Mosher 1981) per con-

tattare anche altri Strigiformi. Sono state censite 5 specie, in ascolto o avvistamento diretto; la civetta è stata contattata nel 82.1% dei 28 siti selezionati, l'allocco *Strix aluco* nel 71.4% dei siti, il barbogianni *Tyto alba* nel 7.1%, il gufo comune *Asio otus* nel 3.5% e l'assiolo *Otus scops* nel 21.4%. Il numero più elevato di civette contattate si è registrato in Calabria ($N = 12$) con 6 individui in una singola stazione, mentre l'unico gufo comune censito è stato segnalato in Puglia. Interessante sottolineare come l'allocco sia stato contattato con regolarità, in habitat differenti, dalle Alpi sino al Lazio, con il numero più elevato di contatti ($N = 6$) nella Riserva Naturale del Lago di Vico (VT), mentre in Italia meridionale sono stati contattati con frequenza gli assioli. In due siti, nel livornese e nel pavese, sono state contattate 3 specie (barbogianni, civetta ed allocco).

Ringraziamenti - Questo evento è stato reso grazie al contributo insostituibile di: G. Baldi, M. Banchi, S. Benini, C. Berzeatto, V. Bettani, F. Bricolo, Busia L., M. Bux, G. Calvi, S. Cappelli, C. Crespi, C. Dall'Asta, N. Donà, G. Faggio, D. Fasano, M. Favaron, D. Fiacchini, C. Fracasso, R. Gabriele, J. C. Genot, D. Malagigi, M. Marchese, M. Marrese, E. Morselli, K. Parolin, M. Pascucci, S. Pedrazzi, V. Pianetta, D. Piccolino, P. Politi, L. Ravizza, A. Roccella, F. Roscelli, L. Ruggieri, A. Sgattoni, G. Sgorlon, M. Sighele, D. Signorelli, F. Sottile, A. Tonelli, P. Verucci, M. Visceglia.

Bibliografia - Fuller MR, Mosher JA 1981. *Studies in Avian Biology* 6: 235-246 • Leigh R 2001. *Oriolus* 67: 142-148 • Van Nieuwenhuysse F *et al.* 2001. *Oriolus* 67: 12-21 • Genot JC, Lecomte P 2002. *Delachaux et Niestlè* • Mastrotrilli M 2005. *Araspix Editrice* • Jacquat M 2003. *Nos Oiseaux* 50: 189-190.

Tabella 1 – Partecipanti e rapaci notturni osservati durante la 'Notte europea della civetta', 19 marzo 2005, in 14 regioni italiane.

Regione	N siti	N persone	<i>Tyto alba</i>	<i>Otus scops</i>	<i>Athene noctua</i>	<i>Strix aluco</i>	<i>Asio otus</i>
Lombardia	8	351	1	-	17	18	-
Liguria	1	70	-	-	1	4	-
Veneto	4	103	-	-	9	3	-
Friuli V. G.	1	9	-	-	-	-	-
Emilia Rom.	1	12	-	-	2	1	-
Marche	1	35	-	-	1	5	-
Toscana	3	71	1	-	3	6	-
Lazio	2	91	-	-	3	9	-
Campania	1	3	-	1	-	-	-
Basilicata	1	11	-	3	3	-	-
Puglia	2	15	-	-	3	-	1
Calabria	1	8	-	1	12	-	-
Sicilia	1	19	-	1	4	-	-
Sardegna	1	8	-	-	7	-	-
Totale	28	806	2	6	65	46	1