

BREVIO NOTE

Ripetuta ed inusuale osservazione di Civetta *Athene noctua* in un dormitorio invernale di Gufo comune *Asio otus*

MARCO MASTRORILLI*

*via Carducci, 7 - 24040 BOLTIERE (BG)

Il Gufo comune *Asio otus* in Italia come nella provincia di Bergamo è specie migratrice, nidificante e svernante spesso con aggregazioni di più individui (MIKKOLA, 1983; CHIAVETTA, 1988; STIVAL, 1996).

Nella provincia di Bergamo, sono noti diversi dormitori invernali di Gufo comune (con punte massime di 30 individui) e recentemente è stato scoperto il primo roost urbano nel capoluogo orobico ubicato in periferia in un giardino privato con presenza di pino domestico (arch. LIPU sez. Bergamo, 1998). Tuttavia il maggior numero di roosts conosciuti nella provincia bergamasca è localizzato nel piano basale lungo i principali corsi d'acqua fluviali.

Al contrario la Civetta *Athene noctua* sverna quasi sempre nei territori di nidificazione (FORNASARI *et al.*, 1992) ed anche nella bergamasca (MASTRORILLI, 1997) mostra una preferenza per cascine ed anfratti dislocati in edifici antropici mentre l'avvistamento della specie in aree boschive, risulta abbastanza sporadico.

Le conoscenze bibliografiche riportano come unico Strigiforme avvistato nei roosts il Gufo di palude *Asio flammeus* (CHIAVETTA, 1988) ed occasionali sovrapposizioni di areali di Gufo comune con Allocco *Strix aluco* (CASTALDI *et al.*, 1997).

Compiendo ripetute osservazioni in un dormitorio di Gufo comune nel Parco del Serio, ho assistito ad un fenomeno inusuale. Durante il mese di febbraio nel dormitorio di Zanica (BG), è stato possibile annotare la presenza continuativa per 12 giorni (dal 13 al 25 febbraio) di una Civetta, che sostava in questo roost a pochi metri da vari individui di Gufo comune, nei pressi di una pozza acquitrinosa. La presenza della Civetta sembrava essere ben tollerata dai soggetti di Gufo comune

presenti, indifferenti da tale inconsueta vicinanza.

Complessivamente ho osservato l'individuo di Civetta sempre posata sulla medesima robinia in 5 giorni diversi. Si tratta del primo caso, in Italia, di svernamento parziale di Civetta in un dormitorio di Gufo comune. Dalle osservazioni in mio possesso non mi è possibile desumere se tale presenza sia stata più prolungata del periodo citato.

Bibliografia

- CASTALDI A., GUERRIERI G., MENEGONI P. & PIETRELLI L., 1997 - Regressione degli ecosistemi ed adattabilità degli *Strigiformes* in un'area dell'Italia centrale. AVOCETTA, 21: 93.
- CHIAVETTA M., 1988 - Guida ai rapaci notturni. Zanichelli, Bologna. 189 pp.
- CORSIF. & GIOVACCHINI P., 1995 - Atlante degli uccelli svernanti in provincia di Grosseto. Editrice Caletta. 248 pp.
- FORNASARI L., BOTTONI L., MASSA R., FASOLA M., BRICHETTI P. & VIGORITA V., 1992 - Atlante degli uccelli svernanti in Lombardia. Regione Lombardia e Università degli Studi di Milano, 378 pp.
- MASTRORILLI M., 1997 - Popolazioni di Civetta (*Athene noctua*) e selezioni dell'habitat in un'area di pianura della provincia di Bergamo. Riv. Mus. civ. Sc. Nat. "E. Caffi", 19: 15-19, Bergamo.
- MIKKOLA H., 1983 - Owls of Europe - T & A. D. Poyser, London.
- STIVAL E., 1996 - Atlante degli uccelli svernanti in provincia di Venezia. C.O.R.V.O., 213 pp.

Ricevuto marzo 1998